

# 水溶性ヨード造影剤使用についての説明と同意

ID No. \_\_\_\_\_ 病棟入院 \_\_\_\_\_ 科外来 \_\_才 男 女

殿

予約検査 C T 尿路造影 ( DIP ) 血管造影・IVR その他 \_\_\_\_\_  
予約日時 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 曜日 午前 午後 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分

1. **水溶性ヨード造影剤** 予約されましたX線造影検査では水溶性ヨード造影剤を使用します。ヨード造影剤を使用しますと、血管・臓器などが写し出されて、病気の状態をより正確に知ることができ、その後の治療に役立てることが出来ます。造影剤を注射する際には、熱く感じるがありますが、これは一時的であり心配いりません。そして、造影剤は6時間後に90%が尿に排泄され、24時間後にはすべて体外に排出されます。

2. **副作用とその対応** 最近の造影剤はとても安全ですが、副作用が全くないわけではありません。軽いものを含めると2-3%程度に認められ、それには検査中に生じるもの(即時性)遅れて現れるもの(遅発性)があります。

### 即時性副作用

ほとんどは、吐き気、発疹、頭痛、動悸などの軽い症状で、様子を見るだけで回復しますが、必要に応じて投薬の治療を行います。非常にまれですが、呼吸困難、意識障害、ショックなどの重い副作用を生じることがあります(0.01-0.02%、6000 9000人に1人の割合)この場合は特別な救命のための措置が必要です。これらのために、担当の医師、看護師のほかスタッフ全員で検査中の様子を観察し、万一の副作用には的確に対応いたします。

### 遅発性副作用

まれですが、検査終了の数時間から数日後に極端に体がだるくなったり、発疹が出たりすることがあります。その際は、受診されている診療科または放射線部、救急外来などに連絡下さい。医師または看護師が対応します。

### 自動注入にともなう副作用

最近の高速CT装置では造影剤を自動的に注入するために、一部が血管外にもれて、腫れたり、痛みを伴ったりすることがあります。ほとんどは自然に吸収され問題ありませんが、まれに処置が必要な場合があります。

3. **問診** アレルギーの方は副作用の可能性が高くなります。下記の間診をチェックしていただき、該当の項目を説明医師にお知らせ下さい。検査当日の状態をも参考にして、最終的に担当医がヨード造影剤使用を決めます。

### 問診・説明

無有

以前にヨード造影剤を使用して副作用があった。いつ ( \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 )

何の検査 ( C T 尿路造影 血管造影 その他 \_\_\_\_\_ )

どんな症状 ( 発疹 はきけ・嘔吐 その他 \_\_\_\_\_ )

ぜんそくやアレルギー体質がある。

( ぜんそく アトピー性皮膚炎 アレルギー性鼻炎 食物アレルギー 薬剤アレルギー )

腎機能障害あるいは腎不全と言われた。

妊娠している、または妊娠の可能性がある。

重症の甲状腺疾患がある。

糖尿病の薬(メドット錠や、同等品であるメルビン錠、ネルビス錠、メトリオン錠、グリコラン錠、メトホルミン塩酸塩錠)を服用している。

説明医師 \_\_\_\_\_ 科 \_\_\_\_\_

問診上は注意すべき事項がありますが、検査することを勧めます。

### 同意書

私は、水溶性ヨード造影剤使用の説明を受け了承しましたので、必要に応じて同剤の投与を受けることに同意します。

天理よろづ相談所病院院長 殿 平成 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

本人の署名 \_\_\_\_\_

保護者または代理人の署名 \_\_\_\_\_